

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 18 / 21 aprilie 2020

Oficiul Fitosanitar Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile agricole **LEGUME, CĂPȘUN, CARTOF** împotriva organismelor de dăunare: **MELCI CU** și **FĂRĂ COCHILIE, COROPIȘNIȚĂ** (*Gryllotalpa* g.), **VIERMI SÂRMĂ** (*Agriotes* sp.), **CĂRĂBUȘUL DE MAI** (*Melolontha* m.).

Tratamentul se va aplica pe suprafețele pe care există:


- rezervă din anul anterior de coropișnițe sau plante roase de coropișnițe;
- prezența în sol a larvelor cărăbușului de mai și a viermilor sârmă;
- prezența melcilor în cultură sau dăre de mucus alb și lipicios pe sol și plante.




Limax



Melci cu cochilie



Coropișniță



Viermi sârmă



Cărăbușul de mai

Pentru combaterea organismelor de dăunare, se recomandă utilizarea unui produs de protecție a plantelor, omologat:

Nr. crt.	Denumire produs de protecție a plantelor	Doza omologată (kg/ha)	Cultura la care se aplică	Organism de dăunare combătut
1.	OPTIMOL	4,0 – 5,0	căpșun, legume, cartof	limacși și melci
2.	AGROSAN B	15,0	legume de câmp	melci fără cochilie
3.	ALLOWIN	4,0 – 5,0	căpșun, legume, cartof	limacși și melci
4.	COROCID SUPER	20,0	tomate	coropișniță
5.	META GOLD 3% (ARION PRO 3G)	7,0	salată	melci
6.	META GOLD 5%	4,0	salată	melci
7.	TRIKA EXPERT	10,0 – 15,0	legume, cartof	viermi sârmă și cărăbușul de mai

Perioada optimă de tratament: - Prezența organismelor de dăunare în sol / pe plante

- **Tratamentul se va repeta în perioada de vegetație, când sunt semne că există dăunători în cultură.**
- **Înainte de utilizarea produsului de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestuia!**

Alte recomandări:

- **Pentru combaterea melcilor** - produsele se pot utiliza înainte de semănat/plantat, la plantare și/sau în timpul vegetației, prin împrăștiere uniformă la suprafața solului, în benzi corespunzătoare rândurilor de plante, sau sub formă de mici cantități de granule, din loc în loc. **Produsele NU se încorporează în sol.** Rezultate maxime se obțin în condiții de umiditate.

- **Pentru combaterea coropișnițelor, a larvelor cărăbușului de mai și a viermilor sârmă** - se recomandă **încorporare ușoară în sol** a produsului de protecție a plantelor utilizat.

- Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor (p.p.p.) se vor plia, iar cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat.

- Ambalajele se vor depozita până la predarea acestora unei societăți autorizate să colecteze ambalaje de pesticide, sau se pot preda în campaniile "SCAPA de ambalaje" – www.aiprom.ro.

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor, se vor respecta prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2013 (actualizată) a apiculturii.

Se vor lua măsurile care se impun pentru protecția mediului înconjurător. Se vor respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitate a muncii și de protecție a animalelor.

Coordonator Oficiul Fitosanitar
Livia Dana ALDEA

Întocmit
Cons. sup. Ana TIMAR